

2024 Disease and Symptom Exclusion Recommendations/Regulations

Disease and/or Symptom		<u>Exclusion/Readmit</u> in accordance to K.A.R.28-1-2,28-1-6 and Kansas Statute 65-122
Symptom	Diarrhea/Vomiting	Diarrhea-free for 24 hours without the aid of medication. No vomiting for 24 hours.
	Eyes inflamed with purulent discharge	No exclusion. If bacterial conjunctivitis, allowed to remain in school once any prescribed therapy is implemented.
	Fever with or without other symptoms	Fever-free for 24 hours without the aid of medication.
	Rash	Consider exclusion pending a physician evaluation for explanation of rash.
	Fifth Disease	Exclude until fever-free for 24 hours without aid of medication, no longer considered contagious once rash has appeared.
	Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD)	Exclude until fever-free for 24 hours without the aid of medication and no open lesions.
	Hepatitis A*	Exclude for 14 days after onset of illness/7 days following onset of jaundice.
	Impetigo	Exclude until treated for 24 hours with antibiotic or physician note.
	Measles*	Exclude for 4 days after onset of rash; susceptible contacts that are not age-appropriately vaccinated within 72 hours of first exposure shall be excluded for 21 days following the last exposure to an infectious case.
	MRSA (<i>Methicillin-resistant Staphylococcus aureus</i>)	If lesions can be covered, then no exclusion; if lesions cannot be covered, exclude until lesions have crusted over.
	Mononucleosis	Fever-free for 24 hours without the aid of medication.
	Mumps*	Exclude for 5 days from onset of parotitis; susceptible contacts shall be excluded from day 12 to day 25 after exposure to an infectious case.
	Norovirus	Laboratory confirmed cases shall be excluded until 48 hours symptom free.
	Pertussis (Whooping Cough)	Exclude until completion of appropriate antibiotic therapy. Susceptible contacts not excluded, only monitored.
	Respiratory Virus Illness (COVID-19, Flu, RSV)	Exclude until both are true: symptoms are getting better and no fever for 24 hours without aid of medication. Upon return to normal activities, take additional precautions over the next 5 days.
	Ringworm (Tinea)	No exclusion if receiving treatment; no activities involving skin-to-skin contact until lesions are completely healed.
	Rubella (German measles) *	Exclude for 7 days following onset of rash; susceptible contacts shall be excluded for 21 days following last exposure to a case.
	Scabies	Exclude until treated for 24 hours with anti-parasitic.
	Shiga-toxin producing <i>Escherichia coli</i> (STEC)*	<i>Childcare Only:</i> Exclude until two negative stool cultures are obtained (must be 24 hours apart and 48 hours after discontinuation of antibiotics). <i>School:</i> Diarrhea-free for 24 hours without the aid of medication.
	Shigellosis*	<i>Childcare Only:</i> Exclude until one negative stool culture is obtained (collected 48 hours after discontinuation of antibiotics). <i>School:</i> Diarrhea-free for 24 hours without the aid of medication.
	Shingles	If lesions can be covered, then no exclusion; if lesions cannot be covered, exclude until lesions have crusted over.
	Streptococcal disease (strep throat and scarlet fever)	Exclude for 24 hours following initiation of antimicrobial therapy; if not receiving therapy exclude for 10 days following onset of symptoms.
	Varicella (Chickenpox)*	Exclude until all lesions have formed scabs or crusted over; each susceptible contact not age-appropriately vaccinated within 72 hours of first exposure. shall be excluded for 21 days from the last exposure to an infectious case.

***Please call JCDHE Disease Containment Hotline at 913-826-1303 for further guidance.**

JCDHE Child Care Licensing Hotline at 913-477-8361.

2024 Disease and Symptom Exclusion Recommendations/Regulations

Disease and/or Symptom	Exclusion/Readmit in accordance to K.A.R.28-1-2,28-1-6 and Kansas Statute 65-122
Diarrhea/Vomiting	Diarrhea-free for 24 hours without the aid of medication. No vomiting for 24 hours
Eyes inflamed with purulent discharge	No exclusion. If bacterial conjunctivitis, allowed to remain in school once any prescribed therapy is implemented.
Fever with or without other symptoms	Fever-free for 24 hours without the aid of medication. (Blue Valley nursing standard is fever =100°F or above)
Rash	Consider exclusion pending a physician evaluation for explanation of rash.
Fifth Disease	Exclude until fever-free for 24 hours without aid of medication, no longer considered contagious once rash has appeared
Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD)	Exclude until fever-free for 24 hours without the aid of medication and no open lesions
Hepatitis A*	Exclude for 14 days after onset of illness/7 days following onset of jaundice
Impetigo	Exclude until treated for 24 hours with antibiotic or physician note
Measles*	Exclude for 4 days after onset of rash; susceptible contacts that are not age appropriately vaccinated within 72 hours of first exposure shall be excluded for 21 days following the last exposure to an infectious case
MRSA (<i>Methicillin-resistant Staphylococcus aureus</i>)	If lesions can be covered, then no exclusion; if lesions cannot be covered, exclude until lesions have crusted over
Mononucleosis	Fever-free for 24 hours without the aid of medication
Mumps*	Exclude for 5 days from onset of parotitis; susceptible contacts shall be excluded from day 12 to day 25 after exposure to an infectious case
Norovirus	Laboratory confirmed cases shall be excluded until 48 hours symptom free.
Pertussis (Whooping Cough)	Exclude until completion of appropriate antibiotic therapy. Susceptible contacts no longer need to be excluded, only monitored.
Respiratory Virus Illness (COVID-19, Flu, RSV) See CDC Recommendations	Exclude until both are true: symptoms are getting better and no fever for 24 hours without aid of medication. Upon return to normal activities, take additional precautions over the next 5 days.
Ringworm (Tinea)	No exclusion if receiving treatment; no activities involving skin-to-skin contact until lesions are completely healed.
Rubella (German measles) *	Exclude for 7 days following onset of rash; susceptible contacts shall be excluded for 21 days following last exposure to a case
Scabies	Exclude until after treatment with anti-parasitic
Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC)*	School: Diarrhea-free for 24 hours without the aid of medication.
Shigellosis*	School: Diarrhea-free for 24 hours without the aid of medication
Shingles	If lesions can be covered, then no exclusion; if lesions cannot be covered, exclude until lesions have crusted over.
Streptococcal disease (scarlet fever and sore throat)	Exclude for 24 hours following initiation of antimicrobial therapy; if not receiving therapy exclude for 10 days following onset of symptoms
Varicella (Chickenpox)*	Exclude until all lesions have formed scabs or crusted over; each susceptible contact not age-appropriately vaccinated within 72 hours of first exposure shall be excluded for 21 days from the last exposure to an infectious case

Please call JCDHE Disease Containment Hotline at 913-826-1303 for further guidance. jocogov.org

8/9/24

[JCDHE 2024 Disease and Symptom Exclusion Recommendations/Regulations](#)

2024 Recomendaciones/reglamentos de exclusión de síntomas y enfermedades

Síntoma	Enfermedad y/o síntoma	<u>Exclusión/readmisión</u> de acuerdo a K.A.R.28-1-2.28-1-6 y Kansas Statute 65-122
	Diarrea/vomito	Libre de diarrea por 24 horas sin ayuda de medicamento. Libre de vomito por 24 horas.
	Ojos inflamados con secreción purulenta	Ninguna exclusión. Si es conjuntivitis bacteriana aguda, puede permanecer en la escuela después de que se haya implementado un tratamiento prescrito.
	Fiebre con o sin otros síntomas	Libre de fiebre por 24 horas sin ayuda de medicamento.
	Sarpullido	Considerar la exclusión en espera de una evaluación médica para explicar el sarpullido.
	Eritema infeccioso	Excluir hasta que esté libre de fiebre por 24 horas sin ayuda de medicamento, ya no se considera contagioso una vez que haya aparecido la erupción.
	Enfermedad de manos, pies y boca (HFMD)	Excluir hasta que esté libre de fiebre por 24 horas sin ayuda de medicamento y sin lesiones abiertas.
	Hepatitis A*	Excluir por 14 días después del inicio de la enfermedad/7 días después del inicio de la ictericia.
	Impétigo	Excluir hasta que sea tratado durante 24 horas con antibiótico o tenga una nota médica.
	Sarampión*	Excluir por 4 días después del inicio del sarampión; los contactos susceptibles que no estén vacunados apropiadamente para su edad dentro de las 72 horas posteriores a la primera exposición serán excluidos durante los 21 días siguientes a la última exposición a un caso infeccioso.
	SARM (<i>Staphylococcus aureus</i> resistente a la meticilina)	Si las lesiones pueden ser cubiertas, entonces no hay exclusión; si las lesiones no pueden ser cubiertas, excluir hasta que las lesiones formen costras.
	Mononucleosis	Libre de fiebre por 24 horas sin ayuda de medicamento.
	Paperas*	Excluir por 5 días desde el inicio de la parotiditis; los contactos susceptibles serán excluidos desde el día 12 al día 25 después de la exposición a un caso infeccioso.
	Norovirus	Se excluirán los casos confirmados por laboratorio hasta que estén libres de síntomas por 48 horas.
	Tos ferina (Pertussis)	Excluir hasta completar la terapia antibiótica adecuada. Los contactos susceptibles no serán excluidos, sólo monitoreados.
	Virus respiratorio (COVID-19, Influenza, VRS)	Excluir hasta que lo siguiente sea cierto: los síntomas están mejorando y no hay fiebre por 24 horas sin ayuda de medicamento. Al regresar a las actividades normales, tome precauciones adicionales en los siguientes 5 días.
	Tiña (corporal)	Ninguna exclusión si está recibiendo tratamiento; ninguna actividad que involucre el contacto de piel-a-piel hasta que las lesiones estén completamente sanas.
	Rubéola*	Excluir por 7 días después del inicio de la erupción; los contactos susceptibles serán excluidos por 21 días después de la última exposición al caso.
	Sarna	Excluir hasta ser tratado por 24 horas con antiparasitarios.
	<i>E. Coli</i> Productora de Toxina Shiga (STEC)*	<i>Cuidado infantil solamente:</i> Excluir hasta que se obtengan dos cultivos de heces negativos (deben ser con 24 horas de diferencia y 48 horas después de la interrupción de los antibióticos). <i>Escuela:</i> Libre de diarrea por 24 horas sin ayuda de medicamento.
	Shigelosis*	<i>Cuidado infantil solamente</i> Excluir hasta que se obtengan dos cultivos de heces negativos (recolectado 48 horas después de la interrupción de los antibióticos). <i>Escuela:</i> Libre de diarrea por 24 horas sin ayuda de medicamento.
	Culebrilla (herpes zóster)	Si las lesiones pueden ser cubiertas, entonces no hay exclusión; si las lesiones no pueden ser cubiertas, excluir hasta que las lesiones formen costras.
	Infecciones por estreptococo (faringitis estreptocócica y la fiebre escarlatina)	Excluir durante las 24 horas después del inicio de la terapia antimicrobiana si no recibe terapia, excluir durante 10 días después del inicio de los síntomas.
	Varicela (Chickenpox)*	Excluir hasta que todas las lesiones hayan formado costras; cada contacto susceptible no vacunado apropiadamente para su edad dentro de las 72 horas posteriores a la primera exposición. Quedará excluido durante 21 días a partir de la última exposición a un caso infeccioso.

***Llame a la línea directa de contención de enfermedades de JCDHE al 913-826-1303 para orientación adicional.
Línea directa de licencias para cuidado infantil de JCDHE al 913-477-8361.**

Recomendaciones de exclusión de Enfermedades y Síntomas

Regulaciones 2023

Enfermedad y/o Síntoma	<u>Exclusión/Readmisión</u> de acuerdo con K.A.R. 28-1-2, 28-1-6 y Estatuto de Kansas 65-122
Pie de atleta/Parásitos intestinales	Sin exclusión necesaria.
COVID-19** (Vea Recomendaciones de los CDC)	Excluir por 5 días después del comienzo de los síntomas o día de la prueba positiva, de ser asintomáticos. Use mascarilla hasta el día 10; si no puede usar mascarilla, excluir por 10 días. Los Contactos deberían usar mascarilla por 10 días después de la última exposición, recomienda tomar la prueba el día 6. Estrategias de mitigación por capas deben ser utilizadas. Consulte las políticas específicas de la escuela o guardería.
Diarrea/Vomito/Sarpullido	Libre de diarrea por 24 horas sin la ayuda de medicamento/ Libre de vomito por 24 horas / Sarpullido: Considera la exclusión en la espera de una evaluación médica.
E. Coli (Shiga Toxin-producing E. Coli including E. Coli 0157:H7 and 026) *	Solamente para Guarderías: Excluir hasta que se obtengan dos cultivos de heces negativos (deben ser con 24 horas de diferencia y 48 horas después de haber descontinuado los antibióticos) Escuela: Estar libre de diarrea por 24 horas sin la ayuda de medicamento
Ojos inflamados con flujo purulento	Sin exclusión. De ser conjuntivitis bacteriana, se les permite permanecer en la escuela una vez que el tratamiento prescrito sea implementado.
Fiebre con o sin síntomas	Hasta estar libre de fiebre por 24 horas sin la ayuda de medicamentos.
Quinta Enfermedad	Excluir hasta estar libre de fiebre por 24 horas sin la ayuda de medicamentos, no se considera contagiosa una vez que el sarpullido ha aparecido.
Enfermedad de Manos, Pies y Boca	Excluir hasta estar libre de fiebre por 24 horas sin la ayuda de medicamento y sin lesiones abiertas.
Hepatitis A*	Excluir por 14 días después del comienzo de la enfermedad/7 días después del comienzo de la ictericia.
Impétigo	Excluir hasta haber recibido tratamiento con antibiótico por 24 horas o nota del doctor.
Influenza	Diagnosticada por el Medico : Excluir por 5 días después de la aparición de la enfermedad. Si la fiebre continua más de 5 días, continuar la exclusión por 24 horas después de haber estado libre de fiebre.
Sarampión*	Excluir por 4 días después del comienzo del sarpullido; los contactos susceptibles que no estén vacunados apropiadamente de acuerdo con la edad durante las primeras 72 horas después de la exposición, serán excluidos por 21 días después de la última exposición a un caso infeccioso.
SARM (MRSA por sus siglas en inglés)	Si las lesiones están cubiertas, no hay necesidad de exclusión; Si las lesiones no pueden cubrirse, excluir hasta que las lesiones hayan formado costra
Mononucleosis	Hasta estar libre de fiebre por 24 horas sin la ayuda de medicamentos.
Paperas*	Excluir 5 días desde de la aparición de parotiditis; contactos susceptibles serán excluidos del dia 12 al dia 25 después de la exposición a un caso infeccioso.
Protosis/Tosferina	Excluir hasta completar la terapia de antibióticos apropiada (los contactos susceptibles no necesitan ser excluidos, solo monitoreados).
Tiña	Excluir hasta el comienzo del tratamiento; evitar actividades de contacto de piel a piel hasta que las lesiones estén completamente recuperadas.
Rubiola (Sarampión alemán) *	Excluir por 7 días después del comienzo del sarpullido; contactos susceptibles serán excluidos por 21 días después de la última exposición.
Sarna	Excluir hasta finalización del tratamiento con un antiparasitario aprobado.
Shigelosis*	Guarderías Solamente: Excluir hasta que se obtenga un cultivo de heces negativo (tomado 48hrs después de la descontinuación de antibióticos) Escuela: Libre de diarrea por 24 horas sin la ayuda de medicamentos.
Culebrilla (Herpes Zóster)	Si las lesiones pueden cubrirse, sin exclusión; si las lesiones no pueden cubrirse, excluir hasta que las lesiones hayan formado costra.
	Excluir por 24 horas después del comienzo de la terapia antimicrobiana; si no está recibiendo terapia, excluir por 10 días después del comienzo de los síntomas.
Varicela*	Excluir hasta que las lesiones han formado costra o se hayan secado; cada contacto susceptible no vacunado de acuerdo con la edad durante las primeras 72 horas después de la exposición deberá ser excluido por 21 días después de la última exposición a un caso infeccioso.

Rv. 8/23 *Llame al Departamento de Salud para guías adicionales, 913-826-1303

** Guarderías: 913-477-8361

Health

11875 S. Sunset, Suite 300, Olathe, KS 66061
 6000 Lamar, Suite 140, Mission, KS 66202
 (913) 826-1200 • fax (913) 826-1300
 TDD: 800-766-3777

jocogov.org



Environmental & Child Care Licensing

11811 S. Sunset, Suite 2700, Olathe, KS 66061
 Environmental (913) 715-6900 • fax (913) 715-6970
 Child Care (913) 477-8339 • fax (913) 477-8035
 TDD: 800-766-3777

Recomendações/critérios de exclusão em caso de doenças e sintomas 2024

Doença e/ou sintoma	<u>Exclusão/readmissão</u> em conformidade com os K.A.R.28-1-2,28-1-6 e o Kansas Statute 65-122
Diarreia/vómitos	Ausência de diarreia durante 24 horas sem o auxílio de medicamentos. Ausência de vómitos durante 24 horas
Olhos inflamados com secreção purulenta	Sem exclusão. Em caso de conjuntivite bacteriana, é permitido permanecer na escola após a aplicação da terapêutica prescrita.
Febre com ou sem outros sintomas	Ausência de febre durante 24 horas sem o auxílio de medicamentos. (A norma de enfermagem Blue Valley é febre = 37,7 °C ou superior)
Erupção cutânea	Considerar a exclusão enquanto se aguarda uma avaliação médica para explicar a erupção cutânea.
Eritema infecioso (Quinta doença)	Excluir até ficar sem febre durante 24 horas sem o auxílio de medicamentos. Deixa de ser considerado contagioso após o aparecimento da erupção cutânea
Doença mão-pé-boca	Excluir até à ausência de febre durante 24 horas sem o auxílio de medicamentos e sem lesões abertas
Hepatite A*	Excluir durante 14 dias após o início da doença/7 dias após o aparecimento da icterícia
Impetigo	Excluir até receber tratamento durante 24 horas com antibiótico ou atestado médico
Sarampo*	Excluir durante 4 dias após o aparecimento da erupção cutânea; os contactos suscetíveis que não tenham sido vacinados de acordo com a idade nas 72 horas seguintes à primeira exposição devem ser excluídos durante 21 dias após a última exposição a um caso infecioso
SARM (<i>Staphylococcus aureus</i> resistente à meticilina)	Se as lesões puderem ser cobertas, não há lugar a exclusão; se as lesões não puderem ser cobertas, excluir até que as lesões tenham formado uma crosta
Mononucleose	Ausência de febre durante 24 horas sem o auxílio de medicamentos
Papeira*	Excluir durante 5 dias a partir do início da parotidite; os contactos suscetíveis devem ser excluídos entre o 12.º e o 25.º dia após a exposição a um caso infecioso
Norovírus	Os casos confirmados laboratorialmente devem ser excluídos até que não se verifiquem sintomas durante 48 horas.
Coqueluche (tosse convulsa)	Excluir até à conclusão da terapêutica antibiótica adequada. Os contactos suscetíveis já não precisam de ser excluídos, apenas monitorizados.
Doença por vírus respiratório (COVID-19, gripe, RSV) Ver Recomendações do CDC	Excluir até que se verifiquem as seguintes situações: melhoria dos sintomas e ausência de febre há 24 horas sem o auxílio de medicamentos. Após o regresso às atividades normais, <u>tomar precauções adicionais</u> nos 5 dias seguintes.
Dermatofitose (Tinha)	Não excluir se estiver a receber tratamento; não realizar qualquer atividade que envolva contacto pele-com-pele até que as lesões estejam completamente curadas.
Rubéola (sarampo alemão) *	Excluir durante 7 dias após o aparecimento da erupção cutânea; os contactos suscetíveis devem ser excluídos durante 21 dias após a última exposição a um caso
Sarna	Excluir até depois do tratamento com antiparasitários
Escherichia coli produtora de toxina Shiga (STEC)*	Escola: Ausência de diarreia durante 24 horas sem o auxílio de medicamentos.
Shigelose*	Escola: Ausência de diarreia durante 24 horas sem o auxílio de medicamentos
Herpes Zoster (Zona)	Se as lesões puderem ser cobertas, não há lugar a exclusão; se as lesões não puderem ser cobertas, excluir até que as lesões tenham formado uma crosta.
Doença estreptocócica (escarlatina e dor de garganta)	Excluir durante 24 horas após o início da terapêutica antimicrobiana; se não estiver a receber tratamento, excluir durante 10 dias após o início dos sintomas
Varicela*	Excluir até que todas as lesões tenham formado crostas; cada contacto suscetível que não tenha sido vacinado de forma adequada à idade nas 72 horas seguintes à primeira exposição deve ser excluído durante 21 dias a contar da última exposição a um caso infecioso

Contate a linha direta de contenção de doenças do JCDHE através do número 913-826-1303 para obter mais orientações.

jocogov.org 8/9/24

[Recomendações/critérios de exclusão em caso de doenças e sintomas, JCDHE 2024](#)